

Afbouwen doe je zo:

DE PRAKTISCHE GIDS OM ZO VEILIG MOGELIJK ANTIPSYCHOTICA AF TE BOUWEN NA EEN EERSTE PSYCHOSE



HAMLETT

Handling Antipsychotic Medication:

Long-term Evaluation of Targeted Treatment

Colofon

Deze gids is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de HAMLETT studie, MIND Ypsilon en Anoiksis.

Met dank aan: Shiral Gangadin, Karin Groen, Prof. dr. L. de Haan, dr. M. J. Kikkert, Prof. dr. I. Sommer, Prof. dr. W. A. Veling, ZonMw
Vormgeving: Hadassa Kwetsie

www.HAMLETT.nl

september 2023





Inhoudsopgave

Waarom deze gids?	6
Algemene informatie over HAMLETT	8
Doorgaan of afbouwen: voor- en nadelen	10
Wat kun je verwachten als je gaat afbouwen?	11
Vragenlijst Terugvalsignalen	15

Afbouwschema's Orale Antipsychotica:

amisulpride	23
aripiprazol	25
brexpiprazol	27
cariprazine	29
chloorprotixeen	31
clozapine	33
flupentixol	35
haloperidol	37
lurasidon	39
olanzapine	41
paliperidon	43
pimozide	45
quetiapine	47
risperidon	49
sertindol	51
sulpiride	53
tiapride	55
zuclopentixol	57

Antipsychotica Depot	59
Tapering	61
Antipsychotica afbouwen na meerdere psychoses	62
Antipsychotica equivalenten	64
Afbouw dagboek	65
Afbouwen doe je samen	79
Praktische tips voor naasten	81

Waarom deze gids?

Mensen die voor het eerst een psychose hebben gehad, krijgen meestal **antipsychotica** voorgeschreven. We weten dat deze medicijnen goed helpen om een psychose te behandelen. Ook weten we dat ze goed helpen om een volgende psychose te voorkomen, maar ze hebben ook bijwerkingen die erg vervelend kunnen zijn. Wat voor soort bijwerkingen je krijgt, hangt af van het middel. Sommige medicijnen (bv quetiapine, olanzapine en clozapine) geven vaak klachten van moeheid en gewichtstoename. Andere medicijnen (zoals risperidon, aripiprazol en haloperidol) geven vaak bijwerkingen van het bewegen: je wordt wat strammer, krijgt minder mimiek en spreekt trager. Ook seksuele bijwerkingen, zoals potentiële stoornissen, kunnen voorkomen.

Je krijgt dit boekje omdat je in het kader van de **HAMLETT studie** voornemens bent om jouw antipsychotische medicijnen (op korte of lange termijn) af te bouwen. Inmiddels is dit boekje via hamlett.nl ook beschikbaar voor mensen die niet deelnemen aan de HAMLETT studie. Of het voor jou het beste is om de medicijnen helemaal af te bouwen, of dat het beter is een bepaalde dosis te blijven gebruiken, weten we niet van tevoren. Tijdens deze afbouwperiode zal je daarachter komen. Deze gids is bedoeld om jou en jouw naasten te helpen tijdens het afbouwen.

Het vergt zorg en aandacht om goed te onderzoeken bij welke dosis jij je het beste voelt en wanneer je het beste kunt functioneren. De medicatie helemaal afbouwen is een optie, maar niet noodzakelijk het einddoel. Sommige mensen functioneren namelijk beter met een bepaalde dosis medicijnen. Antipsychotica zijn gemaakt om mensen met psychosegevoeligheid te helpen, dus het is prima als je die hulp kunt gebruiken. Om je tips te geven voor het afbouwen, kan je in deze gids **afbouwschema's** en een **afbouwdagboek** vinden.

In de schema's staan richtlijnen voor het afbouwen van verschillende antipsychotica. Je zult zien dat die schema's steeds een heel langzame afbouw voorstellen. Daarnaast kan je in het dagboek per dag bijhouden hoeveel medicatie je neemt. Door aantekeningen te maken tijdens de afbouw kun je achteraf ook terug lezen bij welke dosis jij je het beste voelde.

Als je gaat afbouwen moet je lichaam weer een nieuwe balans vinden. Soms veroorzaakt dat tijdelijk ontwen- ningsverschijnselen. In deze gids kun je lezen wat dat zijn. Ook valt de bescherming tegen een nieuwe psychose weg, wat soms een aanleiding kan zijn voor terugval. Het is dus belangrijk om goed op te letten of en wanneer klachten uit de psychose terugkomen. Als je een lichte toename van je klachten ervaart hoeft je daar niet meteen van te schrikken. Neem echter wel altijd meteen contact op met je behandelaar. Samen kunnen jullie besluiten of het verstandig is om (tijdelijk) te stoppen met afbouwen of om de dosis (tijdelijk) te verhogen. Om je te helpen bij het nagaan of psychotische klachten terugkomen tijdens het afbouwen, staat in deze gids een **vragenlijst** beschreven die je daarvoor kunt gebruiken. Daarnaast geven we nog extra informatie en tips die jou kunnen helpen tijdens het afbouwen.

Het is fijn wanneer er mensen in jouw directe omgeving zijn die je kunnen bijstaan tijdens het afbouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook zien hoe het met je gaat en of jouw functioneren vooruit of juist achteruit gaat tijdens het afbouwen. Vraag hen om hun mening over jouw functioneren en sta hen toe veranderingen op te merken, in positieve of negatieve richting. Deze zoektocht kunnen jullie het beste samen aangaan. Achter in deze gids staan **tips voor belangrijke mensen om je heen**, die uitleggen hoe ze je mogelijk beter kunnen helpen. Je krijgt twee exemplaren zodat je er één kunt geven aan iemand in je directe omgeving, een familielid of naaste.

Algemene informatie over HAMLETT

De HAMLETT studie is opgezet door een samenwerkingsverband van 23 GGZ instellingen, waaronder het UMC Groningen, UMC Utrecht, AMC Amsterdam, UMC Maastricht en Parnassia. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door psychiaters in verschillende ziekenhuizen en instellingen door heel Nederland. Aan dit onderzoek hebben inmiddels 450 mensen deelgenomen en het protocol voor dit onderzoek is door de medisch ethische toetsingscommissie van het UMC Groningen goedgekeurd. De werving voor de HAMLETT studie is inmiddels afgerond, dus we zijn niet meer opzoek naar nieuwe deelnemers. Hieronder volgt informatie over het doel en de opzet van het onderzoek.

Het is momenteel niet duidelijk of het beter is om de medicatie al kort na herstel langzaam af te bouwen of om pas veel later, of zelfs helemaal niet af te bouwen. Resultaten van verschillende onderzoeken zijn tegenstrijdig. Daarom onderzoeken we nu in de HAMLETT studie of het sociaal functioneren verbetert als de antipsychotische medicijnen binnen 3-6 maanden na remissie* worden afgebouwd. Dit vergelijken we met het blijven gebruiken van antipsychotica volgens de huidige richtlijnen¹. We vergelijken in dit onderzoek twee groepen (condities):

Langer doorgaan groep: mensen in deze groep blijven de antipsychotica gebruiken zoals voorgeschreven door de behandelaar, tenminste 1 jaar in totaal.

Vroeg afbouwen groep: mensen in deze groep gaan de dosering van deze medicijnen langzaamaan verminderen en als dat goed gaat, zelfs helemaal stoppen met het gebruik van antipsychotica.

*Remissie: constante verbetering van psychotische symptomen tot het niveau waarop slechts milde symptomen over zijn die het dagelijks functioneren niet belemmeren.

Of je de medicijnen tot een jaar na de psychose volgens de richtlijnen worden gebruikt of langzaam worden afgebouwd wordt door loting bepaald. De kans op beide condities is 50%.

Op dit moment hebben we geen goede aanwijzingen om voor één van de twee condities een voorkeur te hebben. Beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen, zoals eerder is beschreven. Wanneer uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt dat de ene conditie sterke voordelen heeft boven de andere, dan zal de behandeling daaraan worden aangepast.

Deelname aan het onderzoek duurt in totaal 4 jaar. Tijdens deze periode wordt je regelmatig gecontroleerd door jouw behandelaar en wordt er een onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe het gaat. In de eerste 6 maanden wordt je gevraagd om vier keer naar het ziekenhuis te komen voor een bezoek van ongeveer 2 uur. In de resterende 3,5 jaar volgen nog eens vier bezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt een aantal vragenlijsten en taken afgenomen, wordt er bij twee bezoeken een lichamelijk onderzoek verricht en wordt er drie keer bloed afgenomen.

Fase 1:
6 maanden
4 afspraken

Fase 2:
3,5 jaar
1 afspraak per jaar
(4 in totaal)

Sinds maart 2023 heeft de HAMLETT studie het beoogde einddoel van 450 deelnemers behaald!

1) <http://www.ggzrichtlijnen.nl/uploaded/docs/AF0639SAMENVRichtlSchizofrenie.pdf>

Doorgaan of afbouwen: voor- en nadelen

Wanneer de psychose voorbij is, zijn er twee mogelijkheden: doorgaan met de medicijnen, of langzaam afbouwen. Beide mogelijkheden hebben hun eigen voor- en nadelen.

Doorgaan met antipsychotische medicijnen heeft als **voordeel** dat je beter beschermd bent tegen een volgende psychose. Volgens de huidige richtlijnen wordt het dan ook aangeraden deze medicijnen tenminste 1 jaar te gebruiken om de kans op terugval te verkleinen. Het **nadeel** van het doorgaan met antipsychotica zijn de bijwerkingen, die kunnen verschillen per middel.

Als je na herstel de medicatie **afbouwt**, heeft dat als **voordeel** dat je deze bijwerkingen niet meer hebt. Veel mensen vinden het ook fijn om zo weinig mogelijk medicijnen te gebruiken, dat geeft het gevoel dat de psychose echt voorbij is. Hoewel je de gevoeligheid voor psychose niet helemaal kwijtraakt, zou het kunnen dat je nooit meer een psychose krijgt. Afbouwen moet wel geleidelijk gebeuren. Als iemand erg snel of abrupt stopt met zijn medicatie is de kans op een nieuwe psychose groot. Snel afbouwen is daarom meestal niet verstandig en soms zelfs **nadelig**.

Op de korte termijn heeft doorgaan met medicijnen dus als voordeel dat je een kleinere kans op een nieuwe psychose hebt. Een Nederlandse studie liet echter aanwijzingen zien, dat het gebruik van antipsychotica op de lange termijn een ongunstig effect kan hebben op persoonlijk en sociaal functioneren. Misschien komt dit doordat antipsychotica het denkvermogen negatief beïnvloeden of de motivatie om dingen te ondernemen met andere mensen en de mogelijkheid om te genieten van fijne momenten verminderen. Twee andere studies (één uit Finland en één uit HongKong) lieten juist het omgekeerde zien: ook op de lange termijn gaat het beter met de mensen die medicatie doorgebruiken. Kortom: we weten het nog niet. Om dit te onderzoeken, is de HAMLETT studie opgezet.

Wat kun je verwachten als je gaat afbouwen?

Hoe iemand begint aan afbouwen kan heel wisselend zijn. De een kan niet wachten om zo snel mogelijk te stoppen, terwijl de ander het best spannend vindt om te kijken of het ook met minder of zelfs zonder medicijnen zal lukken. Ook behandelaren vinden het soms lastig. Hoe je er ook aan begint, antipsychotica zijn krachtige medicijnen en afbouwen daarvan kan ingrijpend zijn. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. Hieronder beschrijven we wat je kunt verwachten en waar je zelf op kunt letten.

Ten eerste is het goed om stil te staan bij het feit dat afbouwen ook heel spannend kan zijn. Een psychose is een vervelende en ingrijpende ervaring en je hebt waarschijnlijk een moeilijke tijd achter de rug. Als je daar met behulp van medicatie weer bovenop bent gekomen is het niet vreemd als je je onzeker voelt bij het idee om de medicatie af te bouwen. Gelukkig hoeft je het niet alleen te doen. Betrek je **behandelaar** en bespreek met hem of haar als je je zorgen maakt, maar ook als je iets anders wil. Daarnaast is het belangrijk om **iemand in je omgeving** te hebben bij wie je je prettig voelt en die jou wil helpen. Iemand die jou goed kent zal snel door hebben wanneer het niet goed met je gaat. Op zo'n moment kan het soms moeilijk zijn om dat zelf in te zien. Daarom is het zo belangrijk dat anderen, die jou goed kennen, ook op je letten. Neem hun zorgen serieus en bespreek ze samen. Daarnaast kan die persoon je ook helpen met het bijhouden van je medicatie, met je meegaan naar gesprekken met je behandelaar, helpen met het opstellen van een signaleringsplan, en er gewoon voor je zijn als dat nodig is.

Ten tweede is het goed om je te realiseren dat je lichaam gewend is geraakt aan de medicatie. Als je die gaat afbouwen zal je lichaam weer een nieuwe balans moeten vinden. Dat kan je merken aan verschillende lichamelijke maar ook psychische **klachten**. Deze klachten ontstaan vaak direct na, of al tijdens het afbouwen. Hiernaast vind je een aantal van dit soort klachten (ontwenningssverschijnselen):

Ontwenningsverschijnselen

- * Misselijkheid, duizeligheid
- * Rusteloosheid
- * Slaapproblemen
- * Emotioneel labiel
- * Angst
- * Irritatie, agitatie
- * Moeite met bewegen
(stijfheid, trillen, rusteloosheid, tics)

Je lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan minder medicatie. **Het is daarom van belang om langzaam af te bouwen** volgens het schema dat je met je behandelaar hebt afgesproken. Verderop in deze gids zijn richtlijnen voor geleidelijk afbouwen opgesteld in de afbouwschema's. Die kun je gebruiken. Alhoewel ontwenningsklachten bij het afbouwen vervelend kunnen zijn, hoeven ze niet direct reden te zijn om je zorgen te maken. Vooral als klachten direct op het afbouwen volgen. Wel is het belangrijk om ze altijd te bespreken met je behandelaar en naasten in je omgeving. Samen met je behandelaar kan je bespreken of het verstandig is om bijvoorbeeld het afbouwen even te pauzeren, of de dosis weer (tijdelijk) te verhogen. De klachten kunnen ook weer relatief snel verdwijnen, soms binnen enkele dagen. Laat je hierdoor dus niet ontmoedigen.

Ten slotte is het heel belangrijk dat je niet opnieuw een psychose krijgt. Het kan echter gebeuren dat je tijdens, of na het afbouwen klachten krijgt die horen bij een psychose. Denk hierbij aan vreemde gedachten, hallucinaties (zoals het horen van stemmen) en gevoelens van achterdocht (de overtuiging dat mensen je in de gaten houden of proberen je erin te luizen). Wees hier alert op en neem zo snel mogelijk contact op met je behandelaar. Als dit gebeurt is dat vervelend, maar vaak goed op te lossen. Ga hierover in gesprek met je behandelaar.

Als je eenmaal je medicatie helemaal of gedeeltelijk hebt afgebouwd, vooral in de eerste jaren maar ook daarna, blijft het belangrijk om goed op een **terugval** te letten. Ongeveer 20% van de mensen die een psychose achter de rug hebben krijgt nooit meer een tweede; maar 80% wel. Gelukkig is het meestal zo dat je een terugval langzaam aan voelt komen in de weken daarvoor. Als je daar goed op let is er voldoende tijd om in te grijpen. Hoe je een terugval voelt aankomen is voor iedereen anders.

Deze gids is er ook om je, tijdens en na het afbouwen, te helpen om te letten op klachten die horen bij terugval. Als je het snel opmerkt, kun je er nog op tijd wat aan doen en kun je een ziekenhuisopname en verergering van de klachten voorkomen. Op de volgende bladzijden geven we een aantal **tips** om dat te doen. Ook is er een vragenlijst waarmee je makkelijk je persoonlijke '**terugval signalen**' kan herkennen.

Samenvatting

- * Zoek iemand waar je je prettig bij voelt en die jou goed kent. Hij of zij kan je helpen om op tijd aan de bel te trekken als je klachten krijgt.
- * Bespreek de afbouw met je behandelaar en maak een plan
- * Snel na afbouwen kunnen klachten voorkomen. Neem, zeker als dit tekenen van een psychose zijn, zo snel mogelijk contact met je behandelaar op.
- * Bedenk goed welke signalen er bij jou op zouden kunnen wijzen dat je een terugval krijgt. Maak een signaleringsplan.
- * Afbouwen heeft de grootste kans van slagen als je dat langzaam en zorgvuldig doet. In deze gids staan voorbeelden voor afbouwtrajecten.

Vragenlijst Terugvalsignalen

Terugvalsignalen zijn subtiele veranderingen in gedachten, gevoelens en gedragingen die aanwezig zijn vlak voordat een psychose optreedt. Enkele **belangrijke voorbeelden** zijn een depressieve stemming, terugtrekken uit contacten met vrienden en familie, moeite met inslapen, moeite met je concentreren en steeds maar denken aan een bepaald onderwerp. Maar bedenk dat deze terugvalsignalen verschillen van persoon tot persoon.

Het is belangrijk om te weten dat het opmerken van slechts één signaal niet veel zegt over of je een terugval krijgt. Veranderingen in je stemming of gedachten zijn normaal en dus niet altijd signalen van terugval. Maar meerdere terugvalsignalen samen, die aanwezig zijn over een bepaalde periode, kunnen wel wijzen op terugval.

De terugvalsignalen kunnen in een voorspelbare volgorde optreden. Dat betekent dat de signalen die aanwezig waren vlak voor de eerste psychose, op dezelfde manier kunnen optreden bij een tweede psychose. Het is dus goed om na te gaan wat de signalen waren voorafgaand aan je eerste psychose, want dat zijn waarschijnlijk de signalen waar je op moet gaan letten. Voorbeelden van de terugvalsignalen kan je vinden in de aankomende vragenlijst. Je kan voor jezelf ook zo'n lijst maken met je persoonlijke signalen, wat je een **“vroeg signaleringsplan”** kan noemen. Zo ontstaat de mogelijkheid om vroeg in te grijpen en verergering te voorkomen. Zo'n vroeg signaleringsplan kan je het beste maken met iemand die jou goed kent. Het kan namelijk voorkomen dat jij enkele signalen niet bij jezelf bemerkt, terwijl de ander die wel bij je ziet. Denk ook na over situaties die jou veel stress opleveren. Als je gespannen bent en slecht slaapt, is de kans groter dat je klachten krijgt. Dat zijn dan momenten om een extra vinger aan de pols te houden.

Als je tijdens het afbouwen merkt dat enkele terugvalsignalen aanwezig zijn, neem dan contact op met je behandelaar. Een familielid of naaste met wie je een vroeg signaleringsplan hebt gemaakt kan soms ook goed zien of de terugvalsignalen weer aanwezig zijn. Als naaste mag je contact opnemen met de behandelaar om je zorgen hierover te uiten. Ook kunnen deelnemers aan de HAMLETT studie, of naasten, contact opnemen met het HAMLETT studieteam, als je merkt dat je last hebt van de terugvalsignalen. Wij zijn altijd te bereiken via de mail (hamlett@umcutrecht.nl of hamlett@umcg.nl). Een van ons kan dan ook contact met jou opnemen als je ons via de mail een telefoonnummer doorgeeft.

De onderstaande vragenlijst is handig op verschillende manieren.

(1) Deze vragenlijst laat zien welke terugvalsignalen er allemaal kunnen zijn.

(2) De vragenlijst helpt bij het herkennen van je eigen terugvalsignalen.

(3) De vragenlijst helpt je bij het opstellen van een “vroeg signaleringsplan”.

Lichamelijke veranderingen

Aanwezig tijdens

	Eerste psychose	Afbouwen
Heb je pijn of last van kwaaltjes?	☐	☐
Ben je moe of heb je gebrek aan energie?	☐	☐
Slaap je slecht in of word je vaak wakker?	☐	☐
Lijken je bewegingen vertraagd?	☐	☐
Voel je je rusteloos?	☐	☐
Let je niet meer op je uiterlijk of persoonlijke hygiëne?	☐	☐
Voel je je heel energiek of heb je het gevoel dat je nauwelijks slaap nodig hebt?	☐	☐

Depressieve klachten

Aanwezig tijdens

	Eerste psychose	Afbouwen
Voel je je depressief of 'down'?	☐	☐
Voel je je bang of angstig?	☐	☐
Voel je je gespannen of nerveus?	☐	☐
Voel je je nutteloos of in de steek gelaten?	☐	☐
Voel je je onveilig?	☐	☐
Ben je stil of teruggetrokken?	☐	☐
Ben je ontevreden over jezelf?	☐	☐
Heb je geen zin in eten?	☐	☐
Vinden anderen dat je afwezig bent?	☐	☐
Wil je niet uit je bed komen?	☐	☐
Wil je jezelf pijn doen?	☐	☐
Heb je moeite om met emoties om te gaan?	☐	☐
Wil je niet graag alleen zijn?	☐	☐

**Bron: Clinical practice in early psychosis. Preventing relapse in first episode psychosis. Orygen: The National Centre of Excellence in Youth Mental Health. Orygen.org.au (2016).*

Verhoogde stemming

Aanwezig tijdens

	Eerste psychose	Afbouwen
Komen er constant nieuwe ideeën in je op?	☐	☐
Ben je heel spraakzaam en extrovert?	☐	☐
Voel je je erg zelfverzekerd of extreem blij?	☐	☐
Neem je veel meer op je dan je aankan?	☐	☐
Wil je graag grappen uithalen?	☐	☐
Heb je de neiging om erg veel geld uit te geven?	☐	☐
Heb je geen gevoel voor autoriteit? Het gevoel dat jij alles kan en mag bepalen?	☐	☐

Prikkelbaarheid

Aanwezig tijdens

	Eerste psychose	Afbouwen
Ben je erg koppig?	☐	☐
Word je snel boos of heb je een kort lontje?	☐	☐
Voel je je gewelddadig of agressief?	☐	☐
Ben je dwingend naar anderen toe?	☐	☐

Aandacht en concentratie**Aanwezig tijdens**

	Eerste psychose	Afbouwen
Zijn alledaagse taken nu moeilijk voor je?	☐	☐
Heb je moeite om je aandacht erbij te houden of je te concentreren?	☐	☐
Ben je verward of vergeetachtig?	☐	☐
Lukt het je niet om op je werk of studie of dagbesteding te verschijnen?	☐	☐

Bijzondere/ongebruikelijke ervaringen en gedragingen**Aanwezig tijdens**

	Eerste psychose	Afbouwen
Gedraag je je vreemd zonder duidelijke reden?	☐	☐
Praat of lach je in jezelf?	☐	☐
Is je spraak chaotisch en zitten er vreemde woorden tussen?	☐	☐
Hebben anderen moeite om te volgen wat je vertelt?	☐	☐
Heb je het gevoel dat je gedachten niet van jezelf zijn?	☐	☐
Heb je het gevoel dat anderen je gedachten kunnen lezen?	☐	☐
Heb je het gevoel dat anderen je uitlachen of over je praten?	☐	☐

Heb je het gevoel dat iets op de radio of TV speciaal over jou gaat?	☐	☐
Heb je het gevoel dat je gedachten worden bestuurd?	☐	☐
Heb je het gevoel dat je kan communiceren met de geesten of zielen van mensen die overleden zijn?	☐	☐
Heb je het gevoel dat je iemand anders kan zijn?	☐	☐
Heb je het gevoel dat je in de gaten wordt gehouden?	☐	☐
Denk je dat er is 'geknoeid' met je eten of drinken?	☐	☐

Interesses

Aanwezig tijdens

	Eerste psychose	Afbouwen
Houd je je erg bezig met één of meerdere specifieke dingen, soms ten koste van je dagelijkse bezigheden?	☐	☐
Ben je heel erg enthousiast of opgewonden over iets?	☐	☐
Ben je erg open en expliciet over seksuele dingen?	☐	☐
Ben je de interesse verloren in andere mensen of dingen?	☐	☐


Afbouwschema's Orale Antipsychotica

Op de volgende 36 pagina's staan de voorgestelde afbouwschema's van 18 orale antipsychotica. Ze zijn gerangschikt op alfabetische volgorde.



Om af te bouwen ga je steeds een iets lagere dosis gebruiken. Vooral de laatste stappen zijn moeilijk, omdat dan de kans op terugval hoog is. Die laatste stappen kun je daarom het beste zo geleidelijk mogelijk doen. Van de meeste antipsychotica bestaan geen tabletten met heel lage dosis. Haal daarom bij de apotheek een gratis pillendeler (klein apparaatje om pillen door de helft te doen), zodat je de laatste stap met halve tabletjes kunt zetten.

Afbouwschema amisulpride (Aktiprol, Solian)



Voorgestelde afbouwschema's voor amisulpride (Aktiprol, Solian)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (800 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 150 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 50, 100, 200, 400 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 800	700	600	500	400	350	300
afbouwen vanaf 500	400	350	300	250	200	150
afbouwen vanaf 350	300	250	200	150	100	50
afbouwen vanaf 250	200	150	100	50	25	25
afbouwen vanaf 150	100	50	25	25	25**	stop
afbouwen vanaf 50	25	25	25**	stop		
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	250	200	150	100	50	25
	100	50	25	25	25**	stop
	50	25	25	25**	stop	
	25**	stop				
	na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
	25	25**	stop			

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema aripiprazol (Abilify)



Voorgestelde afbouwschema's voor aripiprazol (Abilify)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (20 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 5 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 5, 10, 15 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 20	17,5	15	12,5	10	10	7,5
afbouwen vanaf 12,5	10	10	7,5	7,5	5	5
afbouwen vanaf 10	7,5	7,5	5	5	2,5	2,5
afbouwen vanaf 7,5	5	5	2,5	2,5	2,5**	2,5**
afbouwen vanaf 5	2,5	2,5	2,5**	2,5**	stop	
afbouwen vanaf 2,5	2,5**	2,5**	stop			
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	7,5	5	5	2,5	2,5	2,5*
	na 26 weken	na 28 weken				
	2,5**	stop				

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema brexiprazol (Rxulti)



Voorgestelde afbouwschema's voor brexpiprazol (Rxulti)

Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (4 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 1 mg), volg je afbouwschema 4.

Tabletten beschikbaar van: 4*, 3*, 2*, 1* mg.


	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 4		3	2	2	1	1	1**
afbouwen vanaf 3		2	2	1	1	1**	1**
afbouwen vanaf 2		1	1	1**	1**	1***	1***
afbouwen vanaf 1		1**	1**	1***	1***	1***	stop
		na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	
		1**	1***	1***	1***	stop	
		1***	1***	1***	stop		
		1***	stop				

* Zonder breukgleuf

** Om de dag 1 dosering

*** Om de 4 dagen 1 dosering

Afbouwschema cariprazine (Reagila)



Voorgestelde afbouwschema's voor cariprazine (Reagila)

Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (6 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 3 mg), volg je afbouwschema 3.

Tabletten beschikbaar van: 1,5*, 3*, 4,5*, 6* mg.


	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 6		4,5	4,5	3	3	1,5	1,5
afbouwen vanaf 4,5		3	3	1,5	1,5	1,5**	1,5**
afbouwen vanaf 3		1,5	1,5	1,5**	1,5**	1,5***	1,5***
afbouwen vanaf 1,5		1,5**	1,5**	1,5***	1,5***	1,5***	stop
		na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
		1,5**	1,5**	1,5***	1,5***	1,5***	stop
		1,5***	1,5***	1,5***	stop		
		1,5***	stop				

* Zonder breukgleuf

** Om de dag 1 dosering

*** Om de 4 dagen 1 dosering

Afbouwschema chloorproxiteen (Truxal)



Voorgestelde afbouwschema's voor chloorproxiteen (Truxal)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (300 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 65 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 15, 50 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 300	250	200	150	115	90	65
afbouwen vanaf 200	150	115	90	65	50	30
afbouwen vanaf 150	115	90	65	50	30	15
afbouwen vanaf 115	90	65	50	30	15	15
afbouwen vanaf 65	50	30	15	15	7,5	7,5
afbouwen vanaf 30	15	15	7,5	7,5	7,5**	stop
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	50	45	30	15	15	7,5
	15	15	7,5	7,5	7,5**	stop
	15	7,5	7,5	7,5**	stop	
	7,5	7,5	7,5**	stop		
	7,5**	stop				
	na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
	7,5	7,5**	stop			

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema clozapine (Leponex)



Voorgestelde afbouwschema's voor clozapine (Leponex)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf een hoge dosis (900 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 150 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 12,5*, 25, 100, 200 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 900	700	500	400	350	300	250
afbouwen vanaf 500	400	350	300	250	200	150
afbouwen vanaf 350	300	250	200	150	100	50
afbouwen vanaf 250	200	150	100	50	25	25
afbouwen vanaf 150	100	50	25	25	12,5	12,5
afbouwen vanaf 50	25	25	12,5	12,5	stop	
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	200	150	100	50	25	25
	100	50	25	25	12,5	12,5
	25	25	12,5	12,5	stop	
	12,5	12,5	stop			
	stop					
	na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
	12,5	12,5	stop			
	stop					

* Zonder breukgleuf

Afbouwschema flupentixol (Fluanxol)



Voorgestelde afbouwschema's voor flupentixol (Fluanxol)

Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf een hoge dosis (18 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 1 mg), volg je afbouwschema 5.


Tabletten beschikbaar van: 0,5, 1, 3, 5 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 18	15	12	9	6	4	3
afbouwen vanaf 12	9	6	4	3	1,5	1
afbouwen vanaf 6	4	3	1,5	1	1	0,5
afbouwen vanaf 3	1,5	1	1	0,5	0,5	0,25
afbouwen vanaf 1	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25*	stop
afbouwen vanaf 0,5	0,25	0,25	0,25*	stop		
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	1,5	1	1	0,5	0,5	0,25
	1	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25*
	0,5	0,25	0,25	0,25*	stop	
	0,25	0,25*	stop			
	na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
	0,25	0,25**	stop			
	stop					

* Zonder breukgleuf

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema haloperidol (Haldol)



Voorgestelde afbouwschema's voor haloperidol (Haldol)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf een hoge dosis (16 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 2 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 1, 5, 10 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 16	12	10	8	6	4	3
afbouwen vanaf 12	10	8	6	4	3	2
afbouwen vanaf 8	6	4	3	2	1	1
afbouwen vanaf 4	3	2	1	1	0,5	0,5
afbouwen vanaf 2	1	1	0,5	0,5	0,5**	0,5**
afbouwen vanaf 1	0,5	0,5	0,5**	0,5**	stop	
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	2	1	1	0,5	0,5	0,5**
	1	1	0,5	0,5	0,5**	0,5**
	0,5	0,5	0,5**	0,5**	stop	
	0,5**	0,5**	stop			
	stop					
	na 26 weken	na 28 weken				
	0,5**	stop				
	stop					

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema lurasidon (Latuda)



Voorgestelde afbouwschema's voor lurasidon (Latuda)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (148 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 37 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 18,5, 37, 74 mg.

	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 148		111	92,5	92,5	74	74	55,5
afbouwen vanaf 92,5		74	74	55,5	55,5	37	37
afbouwen vanaf 74		55,5	55,5	37	37	18,5	18,5
afbouwen vanaf 55,5		37	37	18,5	18,5	9,25	9,25
afbouwen vanaf 37		18,5	18,5	9,25	9,25	9,25**	stop
afbouwen vanaf 18,5		9,25	9,25	9,25**	stop		
		na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
		55,5	37	37	18,5	18,5	9,25
		18,5	18,5	9,25	9,25	9,25**	stop
		9,25	9,25	9,25**	stop		
		9,25**	stop				
		na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
		9,25	9,25**	stop			

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema olanzapine (Zyprexa, Zalasta)



Voorgestelde afbouwschema's voor olanzapine (Zyprexa, Zalasta)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (20 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 2,5 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 2,5, 5, 10, 15, 20 mg.

	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 20		17,5	15	12,5	10	7,5	5
afbouwen vanaf 15		12,5	10	7,5	5	5	2,5
afbouwen vanaf 10		7,5	5	5	2,5	2,5	1,25
afbouwen vanaf 5		2,5	2,5	1,25	1,25	1,25**	1,25**
afbouwen vanaf 2,5		1,25	1,25	1,25**	1,25**	stop	
afbouwen vanaf 1,25		1,25**	1,25**	stop			
		na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
		5	2,5	2,5	1,25	1,25	1,25**
		2,5	1,25	1,25	1,25**	1,25**	stop
		1,25	1,25**	1,25**	stop		
		stop					
		na 26 weken	na 28 weken				
		1,25**	stop				

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema paliperidon (Invega)



Voorgestelde afbouwschema's voor paliperidon (Invega)

Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (12 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 3 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 3*, 6*, 9* mg.

	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
Afbouwschema 1	12	12**	9	9**	9**	6	6
afbouwschema 2	9	9**	9**	6	6	6**	3
Afbouwschema 3	6	6**	3	3	3**	3**	3***
Afbouwschema 4	3	3**	3**	3***	stop		


	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken	na 26 weken
Afbouwschema 1	6**	3	3	3**	3**	3***	stop
Afbouwschema 2	3	3**	3**	3***	stop		
Afbouwschema 3	stop						

* Zonder breukgleuf

** Om de dag 1 dosering

*** Om de 4 dagen 1 dosering

Afbouwschema pimozide (Orap)



Voorgestelde afbouwschema's voor pimozide (Orap)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (20 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 4 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 1, 4 mg.

	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 20		16	12	10	8	6	4
afbouwen vanaf 12		10	8	6	4	3	2
afbouwen vanaf 8		6	4	3	2	1	1
afbouwen vanaf 4		3	2	1	1	0,5	0,5
afbouwen vanaf 2		1	1	0,5	0,5	0,5**	0,5**
afbouwen vanaf 1		0,5	0,5	0,5**	0,5**	stop	
		na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
		3	2	1	1	0,5	0,5
		1	1	0,5	0,5	0,5**	0,5**
		0,5	0,5	0,5**	0,5**	stop	
		0,5**	0,5**	stop			
		stop					
		na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
		0,5**	0,5**	stop			
		stop					

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema quetiapine (Seroquel)




Voorgestelde afbouwschema's voor quetiapine (Seroquel)

Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (800 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 100 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 25, 100, 200, 300 mg.

	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 800		600	500	400	300	200	150
afbouwen vanaf 500		400	300	200	150	100	75
afbouwen vanaf 300		200	150	100	75	50	25
afbouwen vanaf 200		150	100	75	50	25	12,5
afbouwen vanaf 100		75	50	25	12,5	12,5	stop
afbouwen vanaf 50		25	12,5	12,5	stop		
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken	na 26 weken
	100	75	50	25	12,5	12,5	stop
	50	25	12,5	12,5	stop		
	12,5	12,5	stop				
	12,5	stop					

Afbouwschema risperidon (Risperdal)



Voorgestelde afbouwschema's voor risperidon (Risperdal)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (10 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 1,5 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 0,5, 1, 2, 3, 4, 6 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 10	8	6	5	4	3	2
afbouwen vanaf 6	6	5	4	3	2	1,5
afbouwen vanaf 5	4	3	2	1,5	1	0,5
afbouwen vanaf 3	2	1,5	1	0,5	0,25	0,25
afbouwen vanaf 1,5	1	0,5	0,25	0,25	0,25**	0,25**
afbouwen vanaf 0,5	0,25	0,25	0,25**	0,25**	stop	
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	1,5	1	0,5	0,5	0,25	0,25
	1	0,5	0,25	0,25	0,25**	0,25**
	0,25	0,25	0,25**	0,25**	stop	
	0,25**	0,25**	stop			
	stop					
	na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
	0,25**	0,25**	stop			
	stop					

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema sertindol (Serdolact)



Voorgestelde afbouwschema's voor sertindol (Serdolact)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (24 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 6 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 4, 16 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 24	22	20	18	16	14	12
afbouwen vanaf 18	16	14	12	10	8	6
afbouwen vanaf 14	12	10	8	6	4	4
afbouwen vanaf 10	8	6	4	4	2	2
afbouwen vanaf 6	4	4	2	2	2**	stop
afbouwen vanaf 2	2**	stop				
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	10	8	6	4	4	2
	4	4	2	2	2**	stop
	2	2	2**	stop		
	2**	stop				
	na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
	2	2**	stop			

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema sulpiride (Dogmatil)



Voorgestelde afbouwschema's voor sulpiride (Dogmatil)

Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (800 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 150 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 400, 50* mg.


Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 800	600	500	450	400	350	300
afbouwen vanaf 450	400	350	300	250	200	150
afbouwen vanaf 350	300	250	200	150	100	50
afbouwen vanaf 250	200	150	100	50	50	50**
afbouwen vanaf 150	100	50	50	50**	50***	stop
afbouwen vanaf 50	stop					
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	250	200	150	100	50	50
	100	50	50	50**	50***	stop
	50	50**	50***	stop		
	50***	stop				
	na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
	50**	50***	stop			

* Zonder breukgleuf

** Om de dag 1 dosering

*** Om de 4 dagen 1 dosering

Afbouwschema tiapride (Tiapridal)



Voorgestelde afbouwschema's voor tiapride (Tiapridal)


Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf de hoogste dosis (24 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 6 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 100 mg.

Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 600	500	450	400	350	300	250
afbouwen vanaf 400	350	300	250	200	150	100
afbouwen vanaf 300	250	200	150	100	100	50
afbouwen vanaf 200	150	100	100	50	50	50**
afbouwen vanaf 100	100	50	50	50**	stop	
afbouwen vanaf 50	50**	stop				
	na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
	200	150	100	100	50	50
	100	50	50	50**	stop	
	50	50**	stop			
	stop					
	na 26 weken	na 28 weken				
	50**	stop				

** Om de dag 1 dosering

Afbouwschema zuclopentixol (Cisordinol)



Voorgestelde afbouwschema's voor zuclopentixol (Cisordinol)

Doses staan in het schema weergegeven in milligram. De voorgestelde afbouwschema's lopen van hoog naar laag. Wanneer je af gaat bouwen vanaf een hoge dosis (36 mg), volg je afbouwschema 1 zoals weergegeven op de linker bladzijde. Wanneer je afbouwt vanaf een lagere dosis (bijvoorbeeld 8 mg), volg je afbouwschema 5.

Tabletten beschikbaar van: 2, 10, 25 mg.

	Start	na 2 weken	na 4 weken	na 6 weken	na 8 weken	na 10 weken	na 12 weken
afbouwen vanaf 36		32	28	24	20	16	12
afbouwen vanaf 28		28	24	20	16	12	8
afbouwen vanaf 20		16	12	8	6	4	2
afbouwen vanaf 16		12	8	6	4	2	1
afbouwen vanaf 8		6	4	2	1		
1	1**	afbouwen vanaf 4		2	1	1	1*
		na 14 weken	na 16 weken	na 18 weken	na 20 weken	na 22 weken	na 24 weken
		8	6	4	2	1	1
		6	4	2	1	1	1**
		1	1	1**	1**	stop	
		1	1**	1**	stop		
		1**	stop				
		na 26 weken	na 28 weken	na 30 weken			
		1**	1**	stop			
		1**	stop				

** Om de dag 1 dosering

Antipsychotica Depot

Depot medicatie is lastiger af te bouwen dan tabletten. Het kan echter ook, door steeds iets minder van de injectie vloeistof in te spuiten. Hieronder staat een schema om depot medicatie op die manier in 26 weken af te bouwen. Hierbij is rekening gehouden met de halfwaardetijd en doseringsfrequentie, ervan uitgaande dat de huidige toediening binnen de normaal aanbevolen dosis valt:

Voor depots met een doseringsfrequentie van 1 maal per maand:

	Start	4 weken	8 weken	12 weken	16 weken	20 weken
Injectievloeistoffen	80%	60%	40%	20%	10%	5%, daarna stop
paliperidonpalmitaat	150	100	75	50	25	stop
olanzapinepamoaat	405	300	210	stop	stop	stop
aripiprazol ¹	400	300	stop	stop	stop	stop

Voor depots met een doseringsfrequentie van 2 maal per maand:

Start	2 w	4 w	6 w	8 w	10 w	12 w	14 w	16 w	18 w	20 w	22 w
90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	5%	2,5%, daarna stop

		T_{1/2} (halveringstijd) na herhaald toedienen	Doseringsfrequentie
Injectie- vloeistoffen	broomperidondecanoat	25 dagen	4 weken
	fluanzinedecanoat	7-14 dagen	4 weken
	flupentixoldecanoat	17 dagen	2-4 weken
	haloperidoldecanoat	21 dagen	4 weken
	penfluridol (oraal)	4-7 dagen	1 week
	zuclopentixoldecanoat	19 dagen	1-4 weken
Suspensie	aripiprazol ^{1,2} (Abilify Maintena)	28 dagen	4 weken
	olanzapinepamoat ²	30 dagen	2-4 weken
	paliperidonpalmitaat	25-49 dagen	4 weken
	paliperidonpalmitaat ³	84-95 (schouder)/ 118-139 (bilspier)	3 maanden
	risperidon ² (Risperdal Consta)	3-6 dagen	2 weken

¹ Een afbouwschema van 40mg/maand is ook te overwegen, hoewel er (nog) geen wetenschappelijke onderbouwing voor is.

² Eerst wisselen naar orale medicatie of onderstaande schema's hanteren.

³ Eerst wisselen naar paliperidonpalmitaat per 4 weken (Bijv: Risperdal Consta 50 mg/2 weken = paliperidonpalmitaat 100mg/4 weken).

*Bronnen: Knegtering et al., 2011, Farmacotherapeutisch Kompas 2009, Jann e.a. 1985, Rainer 2008, ib-teksten, fda-registratiegegevens van paliperidon juli 2009.

Taperingstrips

Voor geleidelijk afbouwen van antipsychotica kan zogenaamde afbouwmedicatie (taperingstrips, stabilisatiestrips) worden voorgeschreven door de arts. *Tapering* komt van het Engels en betekent geleidelijk verminderen. Samen met de arts kan de persoon die gaat afbouwen hiermee zelf een afbouwschema op maat kiezen. De arts kan het afbouwen goed begeleiden als jullie samen bijhouden hoeveel klachten er zijn door ontwenningsverschijnselen.

Taperingstrips bevatten voorverpakte medicatie voor 28 dagen. Iedere dagelijkse dosis zit in een apart zakje van een plastic strip. Een voordeel van de taperingstrips is dat je zelf geen pillen hoeft te delen. Je kan namelijk de medicatie nemen die per dag zijn voorverpakt. Door één of meer strips achter elkaar te gebruiken kan in korte of langere tijd volgens een gewenst schema op maat worden afgebouwd. De afbouwstappen worden steeds kleiner naarmate de dosis lager wordt. Er zijn meerdere afbouwschema's beschikbaar voor verschillende antipsychotica. De meest geleidelijke afbouw is wat betreft totale duur vergelijkbaar met de schema's die in deze gids staan beschreven (blz 23-58).

Meer informatie over afbouwmedicatie (taperingstrips, stabilisatiestrips en ook switchstrips) is te vinden op de website van het User Research Center van UMC Utrecht www.taperingstrip.nl.

Afbouwmedicatie wordt op dit moment (2023) door twee zorgverzekeraars, ENO en DSW, uit het basispakket vergoed. Of en onder welke voorwaarden andere zorgverzekeraars taperingstrips voor antipsychotica vergoeden zou je zelf kunnen navragen.



Antipsychotica afbouwen na meerdere psychoses

De afbouwschema's (blz. 23-54) in deze gids zijn in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan de HAMLETT studie. Zij hebben allen recent een eerste psychose doorgemaakt en gebruiken pas kort antipsychotica. Over het algemeen wordt aangenomen dat het moeilijker is om antipsychotica af te bouwen wanneer je ze al langer gebruikt. Dat is echter niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs van gedegen onderzoek. Toch denken we wel dat het klopt dat langer gebruik van antipsychotica een reden is om extra langzaam af te bouwen. Waarom dat is leggen we hieronder uit.

Langzaam afbouwen

Het lichaam en ook de hersenen hebben de neiging om zich aan elke situatie aan te passen. Wanneer je langere tijd (jaren) antipsychotica gebruikt, dan wordt dat het nieuwe normaal. Je lichaam en je brein is helemaal ingesteld op die vaste dagelijkse dosis antipsychotica. Wanneer je wilt minderen of zelfs helemaal wilt stoppen, moet je je lichaam goed de tijd geven om aan die nieuwe situatie te wennen. Dat doe je door de dosis langzaam te verlagen. Vooral het laatste deel van de afbouw, zeg maar, de laatste kwart van de medicatie, moet echt langzaam en geleidelijk gaan, anders raakt je lichaam ontregeld en kun je onttrekkingsverschijnselen krijgen.

Langzaam afbouwen gebeurt in kleine stapjes en met voldoende tijd tussen de stapjes. Te snel afbouwen kan leiden tot ontwenningverschijnselen of een nieuwe psychotische episode (blz 11-13). Het kan dus zijn dat je mogelijk langer doet over het afbouwen dan in onze afbouwschema's staat. Neem er goed de tijd voor, liever maanden dan weken. Maar langzamer afbouwen heeft dus voordelen: kleinere kans op een terugval en dus een kleinere kans dat de medicatie opnieuw ingezet moet worden.



Vloeibare antipsychotica

De allerlaatste afbouw stappen, voordat je helemaal stopt met de antipsychotica, dienen dus extra voorzichtig genomen te worden. Ook hele lage doseringen hebben namelijk nog een effect op je lichaam. Om deze laatste afbouw stappen heel geleidelijk te doen, kan het gebruik van vloeibare antipsychotica (druppeltjes of dranken) helpen.

De vloeibare antipsychotica zijn beschikbaar in twee toedieningsvormen: een drank of een druppelvloeistof. Een drank is direct drinkbaar. Dat kan vanaf een lepel ingenomen worden of door het aan te lengen met water. De druppelvloeistof dient altijd opgelost te worden in water of een andere drank (behalve alcoholische dranken). Voor de volgende middelen zijn vloeibare toedieningsvormen beschikbaar:

- aripiprazol
- risperidon
- broomperidol
- haloperidol
- pipamperon
- zuclopentixol

Waar kan je terecht?

Het omrekenen van de laagste dosis tabletten naar druppels of drank is een lastige puzzel. Goed om dit samen te doen met je psychiater of met de apotheker. Als je antipsychotica wil afbouwen raden wij aan om altijd contact op te nemen met een arts. Dat kan de psychiater zijn, maar als je die niet hebt kan je eerst terecht met je vragen bij de huisarts. Vooral de laatste stappen zijn goed om samen met een expert te doen.



Antipsychotica Equivalenten

Deze tabel is geschikt om antipsychotica doseringen van tabletten van het ene type naar het andere type om te rekenen. Dit is vooral een handig hulpmiddel voor behandelaren. Gebruik: De dosis die omgerekend dient te worden delen door getal uit tabel voor bijbehorende equivalent. Voorbeeld: 1mg olanzapine = 0.76 mg aripiprazol (tabel). 1 mg aripiprazol = $1/0.76$ mg olanzapine.

	1 mg olanzapine =	1 mg haloperidol/ risperidon =
olanzapine	1	2.40 (1)
haloperidol	0.42 (1)	1
risperidon	0.41 (1)	0.99 (1)
aripiprazol	0.76 (1)	1.82 (1)
amisulpride	35.4 (1)	84.8 (1)
brexpiprazol	0.22 (1)	0.53 (1)
cariprazine	0.50 (1)	1.21 (1)
clozapine	40.0 (2)	75.0 (2)
flupenthixol	0.60 (3)	0.75 (3)
lurasidon	9.69 (1)	23.2 (1)
paliperidon	0.88 (1)	2.11 (1)
penfluridol	0.60 (3)	0.75 (3)
pimozide	0.40 (3)	0.50 (3)

(1) Leucht et al., Am J Pscyh. (2019) - 95% Effective Dose Method
 (2) Leucht et al., Schiz. Bull (2014) - Minimum Effective Dose Method
 (3) Leucht et al., Schiz. Bull (2016) - DDD Method

Afbouwdagboek

*Hier kun je per dag en week bijhouden welke dosis je hebt ingenomen.

*Ook kun je noteren hoe deze dosis is befallen. Merk je zelf een verschil in je gedrag/gevoel? Heb je deze week last gehad van bijwerkingen? Zijn er nog opmerkingen over je gedrag gemaakt vanuit je omgeving?

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 1	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg
Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij? Last van bijwerkingen? Welke?..... Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving? Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....							

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 2	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....
Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 3	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....
Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 4	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 5	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 6	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 7	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 8	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....
Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....
.....

Week 9	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....
Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....
.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 10	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 11	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 12	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 13	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 14	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 15	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 16	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 17	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 18	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 19	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 20	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 21	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 22	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 23	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg	Datum: Dosis: tabletten van mg tabletten van mg
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 24	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

Week 25	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg

Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?

.....

Last van bijwerkingen? Welke?.....

Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?

Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....

.....

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Week 26	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg	Dosis: tabletten van mg
	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg	 tabletten van mg
Welke dosis nam je deze week en hoe voelde je je daarbij?							
.....							
Last van bijwerkingen? Welke?.....							
Zijn er reacties gekomen vanuit je omgeving?							
Is er iets speciaals gebeurd deze week?.....							
.....							
.....							

Afbouwen doe je samen

Het afbouwen van antipsychotische medicatie brengt met zich mee dat het risico op een tweede psychose een stuk groter wordt. Dat geldt voor de periode tijdens het afbouwen, maar ook voor de periode erna. Vanwege dit risico is het belangrijk om een **vast afbouwmaatje** te hebben, die je goed kent en die feedback kan geven in deze periode.

We vragen je daarom om iemand uit je directe omgeving te kiezen met wie je veel deelt. Dit kan een ouder zijn, je partner, een goede vriend of vriendin, een studiegenoot of huisgenoot. Het beste is het als die speciale persoon je regelmatig ziet.

Zelf kan je tijdens de afbouw bijhouden wat je voelt en merkt; de positieve en de negatieve dingen. Jouw maatje wordt gevraagd hetzelfde te doen. Twee merken immers meer dan één. Bovendien kan iemand anders dingen bemerken die je zelf niet ziet. Bijvoorbeeld: je voelt je kiplekker en je hebt heel veel energie. Maar je vriend of ouder kan bemerken dat je wel erg druk bent en soms irritant. Andersom: wanneer je zelf geen verschil bemerkt kan de ander opmerken dat je rustiger en beter geconcentreerd geworden bent.

Om het mogelijk te maken dat zowel jij als je vaste maatje zo snel mogelijk aan de bel kunnen trekken als het (dreigt) mis te lopen, vragen we jou en je vaste maatje om telefoonnummers uit te wisselen met **het behandelteam**. Bel vooral laagdrempelig, ook bij twijfel. Beter te vaak dan te weinig overlegd. Ook mogen deelnemers van de HAMLETT studie bij zorgen altijd het HAMLETT team benaderen (via mail: hamlett@umcutrecht.nl of hamlett@umcg.nl).

Hieronder is ruimte om alle telefoonnummers op te schrijven. Ook je afbouwmaatje krijgt alle nummers en kan en mag zelfstandig contact opnemen, wanneer hem/haar iets opvalt. Je kan ook het tweede exemplaar van dit boekje aan je afbouwmaatje geven. Op de volgende bladzijde staan namelijk enkele handige tips voor hem/haar.

Telefoonnummers die van belang zijn:

Persoon die antipsychotica afbouwt (naam):

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Behandelteam (naam):

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Vast afbouw maatje (naam):


Telefoonnummer:

E-mailadres:

Praktische tips voor naasten

We realiseren ons dat deelname aan dit onderzoek spannend of belastend kan zijn. Het is dan fijn als er familie of naasten zijn die hierbij kunnen ondersteunen. Hieronder geven we u enkele tips over hoe je dat zou kunnen doen.

* Over het algemeen zijn familie en naasten belangrijk voor iemand die een psychose heeft meegemaakt. Zij kennen de historie en kracht van de persoon en kunnen daarom een grote rol spelen bij het herstel. Het is daarom belangrijk dat a) de persoon in kwestie, b) familie en naastbetrokkenen en c) de behandelaar goed met elkaar samenwerken en afstemmen. Dit wordt ook wel **triadisch werken** genoemd. Zorg dus dat de band met zowel patiënt als behandelaar sterk is en blijft en dat jullie op één lijn liggen.



* Je familielid of naaste heeft besloten, al dan niet in overleg met jou, om aan **het HAMLETT onderzoek** mee te doen. Daarmee levert hij of zij een belangrijke bijdrage aan onze kennis over de behandeling van eerste psychoses en de impact daarvan op het functioneren op langere termijn. Uiteindelijk hopen we mensen met een eerste psychose beter te kunnen helpen en hun perspectief op herstel zo groot mogelijk te maken. Ook voor hem of haar zelf geeft deelname aan dit onderzoek veel inzicht in de voor- en nadelen van medicatie. Voor je familielid of naaste is het natuurlijk heel fijn als je achter deze beslissing staat en hem of haar hierin steunt.

* Vraag aan je familielid of naaste in welke **conditie** hij of zij is geloot, zodat jullie je hier samen op kunnen voorbereiden. In het kader van het onderzoek is het erg belangrijk dat de onderzoeker niet op de hoogte wordt gesteld welke deelnemers afbouwen of niet, om het onderzoek zo zuiver mogelijk uit te blijven voeren. Zoals eerder gezegd: er is geen “goede” of “foute” loting, we weten nu nog niet welke conditie het beste eindresultaat oplevert.

* Voor het onderzoek moet je familielid of naaste verschillende keren naar het ziekenhuis. Vraag of hij of zij het prettig vindt dat je meegaat of hierbij op een andere manier helpt. Het onderzoeksteam kan helpen bij het oplossen van vervoersproblemen, dus neem gerust contact met hen op.

* Voor een optimale werking van de medicatie is het belangrijk dat deze niet wordt vergeten en op het juiste tijdstip wordt ingenomen. **Medicatie trouw innemen** voor langere tijd is echter niet altijd gemakkelijk en veel mensen hebben daar moeite mee. Dit geldt zeker voor mensen die de medicatie het eerste jaar blijven gebruiken, maar ook tijdens het afbouwen van de medicatie. Als je familielid of naaste daar behoefte aan heeft, zou je hierbij kunnen helpen. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat de medicatie op tijd wordt ingenomen. Denk bijvoorbeeld aan een vast tijdstip op de dag, of zorg voor een terugkerend geheugensteuntje.

* Voor sommige mensen die net zijn opgeknapt met medicatie kan het spannend zijn om de medicatie af te bouwen. Zeker voor mensen die de medicatie 3 tot 6 maanden na herstel al gaan afbouwen kan dit een rol spelen. Het kan dan prettig zijn om te weten dat anderen goed op je letten. Uiteraard wordt je familielid of naaste al begeleid door zijn of haar behandelaar, maar extra steun en een waakzaam oog van iemand in de naaste omgeving kan vertrouwen geven.

*Tijdens het afbouwen kunnen sommige klachten tijdelijk in lichte mate terugkomen of verergeren. Dit hoeft niet te betekenen dat iemand terugvalt of in een psychose terecht komt. Het is wel belangrijk om alert te zijn op dergelijke **waarschuwingssignalen** en om die met de behandelaar te delen. Als je twijfels of zorgen hebt, bespreek deze dan in alle openheid met je familielid of naaste en neem gerust contact op met zijn of haar behandelaar. Je kunt ook van te voren met elkaar bespreken op welke signalen je zou moeten letten. Kijk eens samen naar de vragenlijst over terugval symptomen en bespreek welke in jullie situatie van toepassing zouden kunnen zijn. Denk daarbij vooral aan de symptomen die aanwezig waren in de periode voorafgaand aan de eerste psychose.

Wil je meer weten?

Bezoek onze website: www.hamlett.nl

Of bekijk ons filmpje: <http://youtube.nl/>



HAMLETTstudie@umcutrecht.nl
HAMLETTstudie@UMCG.nl

088-7558672 Utrecht
050-3614106 Groningen

Literatuur

(1) Bondgenoten. Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken, Henk-Willem Klaassen, ISBN 978-90-8953-370-8, Uitgeverij Boom, 2014.

(2) Generieke module “Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek”, Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (2016).

(3) Focus op familie bij de behandeling van psychiatrische problematiek. Wiepke Cahn in samenwerking met Jessica Timmer. ISBN 978-94-91969-18-8. DIAGNOSIS uitgevers (2017).

(4) Psychofarmaca afbouwen; de Harm Reduction methode. Will Hall. Uitgegeven door het Icarus Project en het Freedom Center (EN, 2012). ISBN 9-789078-761488. Uitgeverij Tobi Vroegh (NL, 2015).

(5) Knegtering et al., 2011, Farmacotherapeutisch Kompas 2009, Jann e.a. 1985, Rainer 2008, ib-teksten, fda-registratiegegevens van Paliperidon juli 2009.

(6) Clinical practice in early psychosis. Preventing relapse in first episode psychosis. Orygen: The National Centre of Excellence in Youth Mental Health. Orygen.org.au (2016).

Informatie en ondersteuning voor familie/naastbetrokkenen bij:

- | | |
|----------------------------------|--|
| * Anoiksis | www.anoiksis.nl |
| * Ypsilon | www.ypsilon.org |
| * Labyrint In Perspectief | www.labyrint-in-perspectief.nl |
| * Online zelfhulp | www.sensoor.nl ; diverse ggz instellingen |
| * Regionale infocentra GGz, MIND | Regiokamer, www.wijzijnmind.nl |
| * Huisartsen - POH GGz | Huisartsenpraktijk |

En bij deelnemende GGz instellingen:

- | | |
|---|--|
| * Cliënten- en familieraden, MIND | Kamer cliënten- en familieraden,
www.wijzijnmind.nl |
| * Vertrouwenspersonen (PVP, FVP) | www.pvp.nl ; www.lsfvp.nl |
| * Ervaringsdeskundigen t.b.v. cliënten en familie/naasten | Vereniging van Ervaringsdeskundigen,
www.vved.org
Platform Familie-Ervaringsdeskundigen,
www.kenniscentrumphrenos.nl |

